

TD₁₅ – Équations différentielles

Exercice 1 ★

Résoudre les équations différentielles suivantes

1. $y' + \cos(x)y = 0$

3. $y' + \cos^3(x)y = 0$

2. $y' + \frac{1}{x \ln(x)}y = 0$

4. $(1 + x^2)y' - 2xy = 0$

5. $y' + \frac{1 - 2x}{x^2}y = 0$.

Exercice 2 ★

Résoudre les équations homogènes suivantes sur un intervalle de \mathbb{R} que l'on précisera.

1. $(1 + x^2)y' + xy = 0$

3. $y' - \frac{1}{\sqrt{1-x}}y = 0$

2. $2y' - \frac{1}{1+x}y = 0$

4. $xy' + x^2y = 0$

5. $\cos(x)y' + \sin(x)y = 0$

Exercice 3 ★

Résoudre les équations différentielles suivantes :

$(E_1) \quad y'' + y' + y = t^2 + e^t$

$(E_2) \quad y'' - 2y' + y = e^t + \cos(t)$

Exercice 4 ★★

Résoudre les équations différentielles suivantes, en étudiant les éventuels raccordements :

$(E_1) \quad t(t-1)y' + y = t$

$(E_2) \quad (e^t - 1)y' + (e^t + 1)y = 3 + 2e^t$

Exercice 5 ★★

Résoudre $|x|y' - y = x^2$.

Exercice 6 ★★

Soit a un réel strictement négatif. Résoudre $(E) : ty'' + 2y' - aty = 0$ en posant $z(t) = ty(t)$.

Exercice 7 ★★

Soit a et b deux nombres réels et c une fonction continue, le but de cet exercice est de résoudre l'équation différentielle suivante, appelée équation d'Euler :

$$t^2y'' + aty' + by = c(t) \quad (\mathcal{E})$$

Elle ne fait pas partie des équations que le cours nous apprend à résoudre. Via un *changement de fonction inconnue* on va se ramener à une équation que l'on sait traiter

1. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $y'' - 2y' + 5y = 0$

2. Soit $y : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable sur \mathbb{R}_+^* . On définit $z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Justifier que

$$t \mapsto y(t) \quad x \mapsto y(e^x)$$

z est deux fois dérivable sur \mathbb{R} et calculer z' et z'' en fonction de y et de ses dérivées.

3. Montrer que y est solution sur \mathbb{R}_+^* de (\mathcal{E}) si et seulement si z est solution sur \mathbb{R} d'une équation différentielle linéaire d'ordre 2 que l'on précisera.
4. Résoudre l'équation d'Euler

$$t^2 y'' - ty' + 5y = 0 \quad (\mathcal{E}_1)$$

Exercice 8 ★★

On considère l'équation différentielle $(E) : xy''(x) - y'(x) + 4x^3y(x) = 0$.

- Pour $t \in]0, +\infty[$, on pose $f(t) = y(\sqrt{t})$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par f équivalente à celle vérifiée par y .
- Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
- Résoudre (E) sur $] -\infty, 0[$.
- Résoudre (E) sur \mathbb{R} .

Exercice 9 ★★

On considère l'équation différentielle

$$(E) \quad t^2 y'' + 4ty' + 2y = 1$$

- À l'aide du changement de variable $t = e^x$, déterminer les solutions de l'équation différentielle sur $]0, +\infty[$
- En déduire les solutions de (E) sur $] -\infty, 0[$.

Exercice 10 ★★★

Soit $(E) : (1 - t^2)y'' - ty' + y = 0$.

- Résoudre (E) sur l'intervalle $] -1, 1[$ (on pourra poser $t = \cos(u)$).
- Résoudre (E) sur l'intervalle $]1, +\infty[$ (faire un changement de variable bien choisi comme en 1.)
- À l'aide du résultat de la question 2., résoudre (E) sur l'intervalle $] -\infty, -1[$.
- Déterminer les solutions de (E) sur \mathbb{R} .
- Retrouver les résultats précédents par une autre méthode.

Exercice 11 ★★

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad t^2 y''(t) + 4ty'(t) + (2 - t^2)y(t) = 1 \quad \text{sur }]0, +\infty[$$

Résoudre (E) en posant $z : t \mapsto t^2 y(t)$

Exercice 12 ★★

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad (1 + x)y'' - y' - xy = 0 \quad \text{sur }] -1, +\infty[$$

- Déterminer une solution de (E) de la forme $x \mapsto \exp(\alpha x)$
- En déduire toutes les solutions de (E) .

Exercice 13 ★★★

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad (1 + x^2)y'' + 4xy' + \frac{1 + 2x^2}{1 + x^2}y = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

- Soit $h : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$. h est elle solution de (E) ?
- En déduire toutes les solutions de (E) .

Exercice 14 ★★

Résoudre les systèmes différentiels suivants :

$$(S) \begin{cases} x' = x + y \\ y' = x - y \end{cases} \quad (S') \begin{cases} x' = x - y \\ y' = 2y \end{cases}$$

Exercice 15 ★★★

À l'aide d'un système différentiel linéaire, résoudre l'équation linéaire d'ordre 3 :

$$y^{(3)} - 3y'' - y' + 3y = 0.$$

Exercice 16 ★★

Soit $n \geq 1$ et $E = \mathbb{R}_n[X]$. Pour $P \in E$ on pose $f(P) = (X + 1)P' + P$

1. Montrer que f est un endomorphisme de E
2. À l'aide de sa matrice dans la base canonique, justifier que f est diagonalisable.
3. Déterminer les éléments propres de f .

Exercice 17 ★★

Soit E l'ensemble des fonctions de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, +\infty[$ qui s'annulent en 0.

1. Montrer que E est un espace vectoriel
2. Soit $f \in E$, montrer que la fonction $t \mapsto \frac{f(t)}{t}$ est prolongeable par continuité en 0.
3. Pour $f \in E$ et $x \geq 0$ on pose $T(f)(x) = \int_0^x \frac{f(t)}{t} dt$.
Montrer que $T(f)$ est bien définie et que $T(f) \in E$.
4. Montrer que T est un endomorphisme de E .
5. Étudier les éléments propres de T .

Exercice 18 ★★★

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad xy'' + 2y' + xy = 0$$

1. Montrer que (E) admet une solution développable en série entière et préciser son rayon de convergence.
2. Reconnaître cette solution puis résoudre (E) .

Exercices issus d'oraux

Exercice 19 ★★★ (Oral 2008)

Déterminer les fonctions f de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R} telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f''(x) + f(-x) = e^x + e^{-x}$$

On pourra introduire les fonctions $g : x \mapsto f(x) - f(-x)$ et $h : x \mapsto f(x) + f(-x)$

Exercice 20 ★★★ (Oral 2011)

Résoudre à l'aide de séries entières, l'équation différentielle $xy'' + (x-2)y' - 2y = x+2$

Exercice 21 ★★★ (Oral 2012)

On considère l'équation différentielle

$$(E) : \quad x^2 y'' + 4xy' + (2-x^2)y = 0$$

1. Résoudre l'équation différentielle $u'' - u = 0$
 2. Effectuer le changement de fonction $y : x \mapsto \frac{z(x)}{x^2}$ dans (E)
 3. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière au voisinage de 0.
 4. En déduire toutes les solutions. Quelles sont les solutions ayant une limite finie à droite en 0?
-

Exercice 22 ★★ (Oral 2019)

Résoudre le système différentiel $\begin{cases} x' = 7x - y \\ y' = x + 5y \end{cases}$